



KARBOHİDRATLARIN YAPISI

Doç. Dr. Özlem KURT ŞİRİN
2018-2019



Karbohidratların Önemi/Fonksiyonları

- **Hücrelerin temel enerji ihtiyacını sağlayan yakıt maddesi**
- **Hücresel elemanların yapısal bileşenleri**

Birçok canlının temel besin maddesi. Tüm bitki ve bitkisel ürünlerde bol (arpa, çavdar, buğday, mısır, pirinç, patates, havuç..)

Karbohidrat polimerleri bitkilerde destek maddesi, mikroorganizmalarda hücre duvarının temeli, insanda nükleik asitlerin (riboz ve deoksiriboz) ve ekstrasellüler matriksin yapısal bileşeni (glikozaminoglikanlar)

Karbohidrat metabolizması ara ürünleri biosentez reaksiyonlarında öncül madde

Protein (glikoprotein) ve lipitlerle (glikolipit) birleşerek, antijenik özellik, proteinlerin yönlendirilmesi gibi biyolojik olaylar

Karbohidratların Tanımı

- Genel ampirik (kaba) formülleri $C_n(H_2O)_n$ veya $C_n(H_2O)_m$
- Karbohidratların yapısı: C, H ve O; P, N ve S içerenler de bulunur.
- Karbonhidrat ismi, ilk incelen karbohidratların bazılarının bu kaba formüle uydukları saptandığı için ‘karbonun hidratları’ oldukları varsayımından dolayı verilmiştir. Ancak bu kaba formüle uymayan karbohidratlar olduğu gibi P, N ve S içeren karbohidratların da bulunmasıyla artık nomenklatürde **karbohidrat** olarak adlandırılmaktadır.

Karbohidratlar;

- **Polihidroksialdehid, polihidroksiketon veya bunların kondensasyon ürünleri” veya aldehid veya keton grubuna sahip polihidroksialkoller ve hidroliz edildiklerinde bu özellikteki bileşikleri veren organik maddelerdir.**

Karbohidratların Sınıflandırılması

1. Monosakkaridler (1 birim)
2. Oligosakkaridler (2-10 birim)
3. Polisakkaridler (> 10 birim)

Karbohidratların Sınıflandırılması-2

1. Basit Karbohidratlar

Monosakkaridler

Monosakkarid türevleri

2. Kompleks Karbohidratlar

Disakkaridler

Oligosakkaridler

Polisakkaridler


Homopolisakkaridler

Heteropolisakkaridler


1. MONOSAKKARİDLER

- Daha basit bileşiklere hidroliz olmayan polihidroksi aldehid veya polihidroksi ketonlar
- Çoğunlukla tatlı olduklarından şeker (=oz) olarak adlandırılırlar.

ALDOZLAR



KETOSZLAR



Monosakkaridlerin Adlandırılması

Sistemik isimlendirmede;

- Yapılarında bulunan **C atomu sayısının** ve **fonksiyonel karbonil grubunun** (aldehid veya keto gr.) sonuna -oz eki getirilir.

C atomu sayısına göre; Trioz (3C), tetroz (4C), pentoz (5C), heksoz (6C), heptoz (7C)...


Fonksiyonel karbonil grubuna göre;
Aldehid grubu ($\text{H}-\text{C}=\text{O}$) içerenler: **Aldoz**
Keto grubu ($-\text{C}=\text{O}$) içerenler: **Ketoz**

Aldotrioz (3C + aldehid gr.)

Ketotrioz (3C + keto gr.)

Aldopentoz (5C + aldehid gr.)

Ketoheksoz (6C + keto gr.)



- Ketozların adlandırılmasında, çoğunlukla kendilerine karşılık gelen aldozların adlarına “oz” ekinden önce –ul hecesi konur:

5 C’lu Aldopentozun adı: Riboz  Ketopentozunun adı: Ribuloz.

4 C’lu Aldotetrozun adı: Eritroz  Ketotetrozunun adı: Eritruloz

- Özel isimler: Glikoz (üzüm şekeri), Früktoz (meyve şekeri), Galaktoz (süt şekeri)
(İlk izole edildikleri kaynağa göre)

- İnsanda 3-7 C'lu monosakkaridler mevcut.


En basit monosakkaridler:

Gliseraldehid

(Aldotrioz; 3C'lu+ aldehyd gr.)


Dihidroksiaseton

(Ketotrioz; 3C'lu + keto gr.)



D-gliseraldehit

ALDOTRİOZ




Dihidroksiaseton

KETOTRİOZ

- Bütün monosakkaridler, Gliseraldehid ve Dihidroksiaseton'dan türetilmiştir.
- İnsanda fizyolojik öneme sahip aldozlar; D-Gliseraldehid (3C), D-Eritroz (4C), D-Treoz (4C), D-Riboz (5C), D-Arabinoz (5C), D-Ksiloz (5C), D-Glikoz (6C), D-Mannoz (6C), D-Galaktoz (6C)
- İnsanda fizyolojik öneme sahip ketozlar; D-Ribüloz (5C), D-Ksilüloz (5C), D-Fruktoz (6C)


İnsanda fizyolojik öneme sahip aldozlar

Three carbons




D-Glyceraldehyde

Four carbons




D-Erythrose




D-Threose


Five carbons




D-Ribose



D-Arabinose




D-Xylose




D-Lyxose


Six carbons




D-Allose




D-Altrose




D-Glucose




D-Mannose




D-Gulose



D-Idose




d-Galactose



D-Talose


İnsanda fizyolojik öneme sahip ketozlar

Three carbons




Dihydroxyacetone

Four carbons




D-Erythrulose

Five carbons




D-Ribulose




D-Xylulose


Six carbons




D-Psicose



D-Fructose




D-Sorbose




D-Tagatose

Aldozlarda, aldehid grubunun C atomu 1; ketozlarda, keto grubunun karbonuna komşu primer alkol grubunun C atomu 1 numaralıdır.




ALDOPENTOZ



KETOPENTOZ


Monosakkaridlerin Konformasyonu

- Fischer Projeksiyon Formülleri (düz zincir formu)
- Haworth Formülleri (halkalı form)




D-Glukoz

Fischer Projeksiyon




α-D-Glukoz


Haworth Projeksiyon




Haworth projeksiyon




Zarf konformasyonu




Twist konformasyonu



Haworth projeksiyon



Sandalye konformasyonu



Kayık konformasyonu

Monosakkaridlerin Optik Aktivitesi

İzomer: Kapalı formülleri aynı, C atomuna bağlı grupların konfigürasyonları farklı bileşiklerdir. İzomerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır.

İki farklı izomeri bulunur;

- 1) Konstitusyonel (Yapısal) izomeri
- 2) Konfigürasyonel izomeri (Stereoizomeri)


1) Konstitusyonel (Yapısal) izomeri: Bu izomerlerin kapalı formülleri aynıdır, fakat farklı yapıda gruplar içerirler. Ör.; Etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) ve

Dimetil eter (CH_3OCH_3)


2) Konfigürasyonel izomeri (Stereoizomeri)

Bu izomerler, aynı sayı ve aynı türde atom ve gruba sahip, ancak atomlarının üç boyutlu düzenlenmesi (uzaydaki dizilişleri) farklıdır.

Ör.: Glikoz ve galaktoz




- Dört bağının her birinde ayrı bir atom veya atom grubu bulunan karbona **asimetrik karbon** (kiral=Yunanca; kheir=el) denir.
- Asimetrik karbon atomuna sahip bileşiklerin, içerdiği her asimetrik C atomu için 2 stereoizomeri vardır:
(2^n , n: asimetrik C atomu sayısı)




1 Asimetrik karbon atomuna sahipse $2^1 = 2$	} Stereoizomer oluşur.
2 Asimetrik karbon atomuna sahipse $2^2 = 4$	
3 Asimetrik karbon atomuna sahipse $2^3 = 8$	
4 Asimetrik karbon atomuna sahipse $2^4 = 16$	

- Dihidroksiaseton hariç tüm monosakkaridlerin en az 1 tane asimetrik C atomu vardır.
- Asimetrik C atomuna sahip en basit karbohidrat olan gliseraldehidin 1 asimetrik karbonu, 2 stereoizomeri vardır.



D-gliseraldehit



Dihidroksiaseton

 : Asimetrik C atomu

Enantiomer: Birbirinin ayna görüntüsü olan ve aynı düzlemde üst üste gelemeyen bileşiklerdir.



Enantiomerlerin tanımlanmasında gliseraldehid referans bileşik kabul edilir.

Gliseraldehidin izomerleri;


Fischer formülünde,

–OH grubu asimetrik karbonun sağında ise **D**-Gliseraldehid

–OH grubu asimetrik karbonun solunda ise **L**-Gliseraldehid




D-gliseraldehit




L-gliseraldehit

- Birden fazla asimetrik C atomuna sahip monosakkaridlerde, aldehid veya keton grubuna en uzakta bulunan (veya primer alkol grubuna en yakın) asimetrik karbona bağlı –OH grubu, asimetrik karbonun sağında yer alıyorsa **D**, solunda yer alıyorsa **L** izomeridir.



D-glikoz



L-glikoz

- Yapısında asimetrik C atomu bulunan bileşikler optikçe aktiftir ve polarize ışığın düzlemini sağa ya da sola çevirirler. Bu bileşiklere **optik izomer** denir.
- Polarize ışığın düzlemini sağa çevirenler (+) (dekstrorotatuvar; d)
Polarize ışığın düzlemini sola çevirenler (-) (levorotatuvar; l)
- Polarize ışığın çevrilme yönü ve derecesi polarimetre ile ölçülür ve **spesifik çevirme derecesi** $[\alpha]$ ile ifade edilir.

$[\alpha]D^{20}$; optikçe aktif bir maddenin % 100'lük bir çözeltisinin, bir desimetre uzunluğundaki tabakasından geçen monokromatik (tek dalga boylu), polarize sodyum ışığını 20°C'de çevirme açısıdır.

$$[\alpha]D^{20} = \frac{100 \times \alpha}{l \times C} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{100 \times \alpha}{[\alpha]D^{20} \times l}$$



α = Çevirme açısı

l = Polarimetre tübünün uzunluğu

C = Konsantrasyon


$[\alpha]D^{20}$ = Spesifik çevirme (glukoz için 52.5°)

- **D ve L- enantiomerleri çevirme yönünü göstermez!** D ve L şeklinin çevirme yönleri birbirine zıttır.
- Optikçe aktif bir monosakkaridin D ve L izomerlerini eşit konsantrasyonda içeren çözeltilere **rasemik karışım** (DL-karışımı) denir. Bu çözeltilerde optik aktivite görülmez.





Epimerler

- Sadece 1 C atomuna bağlı grupların konfigürasyonları dışında, bütün C atomlarının konumu aynı olan stereoizomerlere **epimer** denir. Bunların birbirine dönüşmesine **epimerizasyon** denir.
- Ör. Glikoz ile galaktoz 4. karbonlarına göre, glikoz ile mannoz 2. karbonlarına göre birbirinin epimeridir. Mannoz ile galaktoz birbirinin epimeri değildir!




Monosakkaridlerin yarıastal ve yarıketal şekilleri (Anomerler ve Mutarotasyon)

- Bir aldehid grubunun alkolle kondanse olması sonucu **yarıasetal (hemiasetal)** oluşur.
- Bir keto grubunun alkolle kondanse olması sonucu **yarıketal (hemiketal)** oluşur.
- 6 veya 5 C atomlu aldoz veya ketozlarda aldehid veya keto grubu aynı molekül içindeki bir –OH gr. ile reaksiyona girerse, monosakkaridin yarıasetal veya yarıketal şekli meydana gelir.



The "straight chain" form of glucose is in equilibrium with the cyclic, six-membered ring form of glucose (the "pyranose" form)




Pyran


(2H-pyran)

Interconversion between an "open" and "closed" form of a molecule is called "ring-chain tautomerism"


- 5 C atomu ile 1 oksijen atomundan meydana gelen halka **piran**; 4 C atomu ile 1 oksijen atomu meydana gelen halka **furan** halkasıdır.
- Aldoheksoz: Piranoz
- Aldopentoz ve ketoheksoz: Furanoz




Piran



Tetrahydropiran




Furan




Tetrahydrofuran

Glikozun 1.C, 5. C'una bağlı –OH grubuyla kondanse olarak piranoz oluşur.




D-glikoz


α -D-glikopiranoz



β -D-glikopiranoz




α -D-glikopiranoz




β -D-glikopiranoz


Früktozun 2.C, 5.C.'una bağlı –OH grubuyla kondanse olarak furanoz oluşur.




D-früktoz




α -D-früktofuranoz



β -D-früktofuranoz





α -D-früktofuranoz



β -D-früktofuranoz

- Sulu ortamda yariasetal ve yariketal oluşturmış bir monosakkaridin, halkalaşma öncesi asimetric olmayan aldehid veya keton grubu karbonu, halkalaşma sonucu asimetric C özelliği kazanır. Bu karbona **anomerik karbon** denir. Anomerik karbonun konfigürasyonundaki farklılık sonucu oluşan bu stereoizomerlere **anomer** denir.
- Anomerik karbona bağlı –OH grubu, halka düzleminin altında yer alıyorsa (aşağıda veya sağda) **α -anomer**,
Anomerik karbona bağlı –OH grubu, halka düzleminin üstünde yer alıyorsa (yukarıda veya solda) **β -anomer** oluşur.
- Anomerler, mevcut izomer sayısını 2 kat arttırır.



- Anomerlerden birini içeren bir çözeltide zamanla diğer anomerin varlığı saptanır. α ve β şekerler, denge halini oluşturmaya kadar birbirlerine dönüşürler. Spontan veya mutarotaz enziminin kataliziyle gerçekleşen bu olaya ***mutarotasyon (çevirme değişmesi)*** denir.
- Monosakkaridlerin α ve β şekilleri çözelti içinde denge halinde bulunurlar. α -glukoz suda çözülürse, başlangıçta $+113^\circ$ 'lik bir spesifik çevirme gösterir. Fakat sonra çözeltinin çevirmesi yavaş yavaş azalır ve nihayet $+52.5^\circ$ 'de sabit kalır. α -glukoz yavaş yavaş kısmen β -glukoza dönüşür.

Önemli Monosakkaridler

- **Triozlar (3 C):** En basit monosakkaridlerdir.

D-gliseraldehid (aldotrioz)

Dihidroksiaseton (ketotrioz)

- **Tetrozlar (4 C):**

Eritroz (aldotetroz): Karbohidrat metabolizmasında ara ürün

- **Pentozlar (5 C):**

D-riboz (aldopentoz): Enzimlerin kofaktör kısmında ve nükleik asidlerde

2-dezoksi-D-riboz: Nükleik asidlerde

L-arabinoz (aldopentoz) ve D-ksiloz (aldopentoz): Bitkilerde polisakkarid halinde

L-ksiluloz (ketopentoz): Glukoz ve glukuronik asid metabolizmalarında ara ürün

- **Heksozlar (6 C):**

Glukoz (aldoheksoz, dekstroz): Kanda, bazı meyvelerde, balda, nişastada, glikojende bulunur. Kanda en çok bulunan ve dokular tarafından kullanılan başlıca şekerdir (Kan şekeri).

Galaktoz (aldoheksoz): Laktozda, serebrozidlerde, bitki polisakkaridlerinde

Fruktoz (ketoheksoz): Balda, bazı meyvelerde, sperma sıvısında


Mannoz (aldoheksoz): Glikoproteinlerde, bitki polisakkaridlerinde

- **Heptozlar (7 C):**


Sedoheptuloz: Karbohidrat metabolizmasında ara ürün

Monosakkaridlerin Kimyasal Özellikleri

- Çok sayıda –OH grubu içerdiklerinden, **suda kolay çözünürler**.
- Monosakkaridler, içerdikleri polialkol gruplarından dolayı **tatlı** bileşiklerdir. (Sakkaroz: 100, Glikoz: 70, Früktoz: 170)
- İndirgeme özelliği: İndirgen şekerler, sıcak ve alkali ortamda, mavi renkli Cu^{2+} tuzlarını, kiremit kırmızısı renkteki Cu^{1+} tuzlarına indirger.



- Osazon kristali oluşumu: Serbest aldehid veya keton grubuna sahip monosakkaridler, fenilhidrazin ile ısıtıldıklarında, sarı renkli osazon kristalleri oluşur.



- Dehidratasyon reaksiyonları: Heksozlardan sıcak ve asit ortamda hidroksimetil furfural, pentozlardan ise furfural türevi oluşur. Bu türevler, bazı fenollerle monosakkaridler için özel renkler verir.

Pentozlar + Orsinol $\longrightarrow$ Yeşil-mavi (Bial testi)

Heksozlar+orsinol $\longrightarrow$ Sarı-kahverengi (Bial testi)


Pentozlar + Floroglisin $\longrightarrow$ Kırmızı

Ketozlar (Früktoz) + Rezorsinol $\longrightarrow$ Kırmızı (Seliwanoff reaksiyonu)

Karbohidrat + α -Naftol + H_2SO_4 $\longrightarrow$ Menekşe renkli halka (Molisch reaksiyonu)

- Fermentasyon:

Monosakkarid+ bira mayası $\longrightarrow$ Etil alkol + CO₂




- ✓ Şekerdeki C sayısı 3 ve 3'ün katları olmalı.
- ✓ -OH gruplarının konumu önemli.

Monosakkarid Türevleri


- Fosfat Türevleri

Monosakkaridlerin fosforik asit esterleridir. Karbohidrat metabolizmasında ara ürünlerdir.


Monosakkaridin –OH grubu + H_3PO_4 esterleşme → Monosakkaridin fosfat türevi




Glukoz-1-fosfat




Glukoz-6-fosfat




Glukoz-1,6-bisfosfat




Fruktoz-6-fosfat




Fruktoz-1-fosfat



Fruktoz-1,6-bisfosfat



Gliseraldehyd-3-fosfat



Dihidroksiaseton fosfat



- **Amino Türevleri**

Monosakkaridin –OH gruplarından birinin yerine amin grubu (-NH₂) bağlanmıştır.


Çoğunlukla hücre membranının yapısındaki polisakkarid ve glikosfingolipidlerin yapısında bulunur.

Glukoz → Glukozamin (kitinde, bazı heteropolisakkaridlerde; örn: Heparin)

Galaktoz → Galaktozamin (kıkırdakta, bazı heteropolisakkaridlerde; örn: Kondroitin sülfat)




- Hücre zarına yerleşmiş bazı glikoprotein ve gangliozydlerde, piruvik asid ve N-asetilmannozamin'in birleşmesiyle oluşan N-asetilnöraminik asid (NANA; sialik asid) bulunur. Dokularda özellikle mukozaların salgısı olan musinlerde ve kan grubu maddelerinde bulunurlar.




- **Asit Türevleri**

Monosakkaridlerin karbonil gruplarının (C=O) ve/veya terminal –OH gruplarının –COOH grubuna oksitlenmesiyle oluşur.

Aldonik asitler: Bir aldozun aldehid grubunun (H-C=O), karboksil grubuna (–COOH) oksitlenmesiyle oluşur. Aldoz, heksoz ise heksonik asid oluşur.




D-Glikoz




**D-Glikonik asit
(Heksonik asid)**

- *Üronik asitler*: Monosakkaridlerin terminal –OH gruplarının –COOH grubuna oksitlenmesiyle oluşur. Aldoz heksoz ise, heksuronik asit oluşur.




D-Glikoz



D-Glikuronik asit*
(Heksuronik asit)

*Glukuronik asid, organizmada fenoller, aromatik asitler, ilaçlar vb. ksenobiyotiklerin zehirsizleştirme reaksiyonlarında kullanılır.

- *Sakkarik asitler*: Hem aldehid hem primer alkol grubunun –COOH grubuna değişmesiyle oluşur.



Glukarik asid
(Sakkarik asid)


• Dezoksi Türevleri

Monosakkaridin bir veya birkaç $-OH$ grubundan oksijenin ayrılmasıyla oluşur.

$-CHOH \longrightarrow -CH_2$ (Deoksiriboz $\longrightarrow$ Riboz)

$-CH_2OH \longrightarrow -CH_3$ (L-Galaktoz $\longrightarrow$ L-Fukoz (6-deoksi-L-galaktoz) -sütteki polisakkaridler, kan grubu maddeleri)

(L-Mannoz $\longrightarrow$ L-Ramnoz (6-deoksi-L-mannoz) -bitki polisakkaridleri)



• Alkol Türevleri

Monosakkaridlerin karbonil grubunun –OH grubuna indirgenmesiyle oluşan polihidrik alkollerdir.

-CHO (aldehid gr.) $\longrightarrow$ -CH₂OH (primer alkol gr.)

-C=O (keto gr.) $\longrightarrow$ -CHOH (sekonder alkol gr.)


Glukoz $\longrightarrow$ Sorbitol

Galaktoz $\longrightarrow$ Dulsitol (Galaktiol)

Mannoz $\longrightarrow$ Mannitol


İnositol $\longrightarrow$ B grubu vitamini, fosfolipidlerde

İnositol + 6H₃PO₄ $\longrightarrow$ Fitik asid $\longrightarrow$ Fitin
Ca²⁺ veya Mg²⁺ tuzu
(Bitkilerde)



Riboz → Ribitol (riboflavinin bileşiminde bulunur)

Gliseraldehid → Gliserol (lipidlerin ön maddesi)
Dihidroksiaseton




Gliserol

2. OLİGOSAKKARİDLER

- 2-10 monosakkarid biriminden oluşurlar.

Bir monosakkaridin asetal veya ketal --OH gr. + Başka bir monosakkaridin --OH gr.





DİSAKKARİD

İki monosakkarid biriminden 1 mol H_2O çıkmasıyla disakkaridler, üç monosakkarid biriminden 2 mol H_2O çıkmasıyla trisakkaridler... vb. meydana gelir.

Disakkaridler

- İki monosakkaridin yapılarındaki –OH grupları arasından 1 mol H₂O çıkararak iki şekerin glikozid bağıyla bağlanmasıyla oluşurlar. Genel kaba formülleri C₁₂H₂₂O₁₁'dir.




Disakkaridlerin sistematik adlandırılması


- Bileşimlerindeki monosakkaridlerin isimleri,
- Bileşimlerindeki monosakkaridin tipi (D, L, α , β),
- İki monosakkarid arasındaki glikozid bağının hangi numaralı karbon atomları arasında olduğu [$\alpha(1\rightarrow4)$, $\beta(1\rightarrow4)$, $\alpha(1\rightarrow2)$],
- İçerdiği halkaların piranoz veya furanoz yapısında oldukları göz önünde bulundurulur.
- Glikozid bağına asetal veya ketal hidroksili ile katılan monosakkaridin adının sonuna **-id** eki getirilir.

Maltoz

- İki mol α -D-glikozun α -(1 $\rightarrow$ 4) glikozid bağıyla bağlanması sonucunda oluşur.
- 4- α -D-Glukopiranoz- α -D-Glukopiranozid
- Besinlerle alınan nişastanın, pankreas ve tükürük bezinden salgılanan α -amilaz ile kısmi hidrolizinden açığa çıkar.
- İndirgendir.



Maltoz
(Haworth formülü)




Maltoz
(Fischer formülü)


Laktoz



- Süt şekeri (Sadece laktasyon sırasında meme bezlerinde sentezlenir). Besinle alınan laktoz, bağırsaktan salgılanan laktaz enzimiyle glikoz ve galaktoza ayrılır.
- α -D-glikoz ve β -D-galaktozun β -(1 $\rightarrow$ 4) glikozid bağıyla bağlanması sonucunda oluşur.
- İndirgendir.



Laktoz
(Haworth formülü)




Laktoz
(Fischer formülü)


Sakkaroz




- Çay şekeri
- Şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilir. İnsan ve hayvan organizmasında bulunmaz.
- α -D-glikoz ve β -D-fruktozun $\beta(1 \rightarrow 2)$ glikozid bağıyla bağlanması sonucunda oluşur.



Sakkaroz
(Haworth formülü)




Sakkaroz
(Fischer formülü)



- Sakkaroz serbest asetal veya ketal hidroksili içermediği için **indirgen değildir**, invert şeker ise **indirgendir**.

Sellobioz

- Doğada serbest halde bulunmaz. Selülozun kısmi hidrolizi ile meydana gelir.
- İki adet β -D-Glukoz molekülünün β -(1 $\rightarrow$ 4) glikozid bağıyla bağlanması sonucunda oluşur.



3. POLİSAKKARİDLER

- 10'dan daha fazla monosakkarid birimi içeren polimer şekerlerdir.
- Polisakkaridlerde, aynı monosakkarid birimleri veya aynı monosakkarid türevlerini içeren polisakkaridlere **homopolisakkarid**, farklı monosakkarid veya farklı monosakkarid türevlerini içerenlere **heteropolisakkaridler** denir.

A) Homopolisakkaridler: Nişasta, glikojen, dekstranlar, selüloz, inülin, kitin


B) Heteropolisakkaridler: Hiyaluronik asid, Heparin, Kondroitin sülfatlar, mukoitin sülfat, kan grubu maddeleri

A) HOMOPOLİSAKKARİDLER


Nişasta

- Bitkilerin depo/yedek polisakkarididir.
- Buğday, mısır, çavdar, arpa, patates, nohut, bezelye, elma ve muzda bol miktarda nişasta içerir.
- İyot ile koyu mavi renk verir.
- Amiloz (%20) ve amilopektin (% 80) moleküllerinden oluşur.
- **Amiloz**, α -D-glikoz moleküllerinin α -(1 $\rightarrow$ 4) glikozid bağıyla bağlanması sonucu oluşur. Dallanma yapmaz. Suda çözünür, iyot ile mavi renk verir.
- **Amilopektin**, α -D-glikoz moleküllerinin α -(1 $\rightarrow$ 4) glikozid bağıyla bağlanması sonucu oluşan düz zincir ve bu zincirin her 25 veya 30. glikozunun 6. karbonuna α -(1 $\rightarrow$ 6) bağıyla bağlanmış yan zincirlerden oluşur. Dallı bir yapı gösterir. Suda çözünmez, iyot ile kırmızı-menekşe renk verir.

Amiloz




Amilopektin





Glikojen


- İnsan ve hayvan organizmasının depo/yedek polisakkarididir.
- Vücutta en çok karaciğer ve kasta bulunur (Kasta daha çok).
- Yapısı amilopektine benzer; tek farkı dallanmanın daha sık olmasıdır. D-glikoz molekülünün $\alpha(1\rightarrow4)$ glikozid bağıyla bağlanması sonucu oluşan düz zincir ve bu zincirin her 11-18 glikoz biriminde $\alpha-(1\rightarrow6)$ bağıyla dallanmasıyla oluşur.
- Molekül ağırlığı birkaç milyon civarındadır.
- İyot ile kırmızı renk oluşturur.
- Glikojen, α -amilaz ve $\alpha-(1\rightarrow6)$ glukozidaz (dallanmayı bozan enzim) tarafından hidroliz edilir.

Glycogen




Glycogen





glycogen



amylopectin




amylose

Selüloz

- Bitkisel kaynaklıdır. Bitkilerin destek maddesini oluşturur (Öz. hücre duvarlarının yapısında)
- Yapı polisakkarididir.
- Molekül ağırlığı 50.000-500.000 arasında değişir.
- Glikoz birimlerinin $\beta(1 \rightarrow 4)$ glikozid bağıyla bağlanmasından oluşan düz zincirlerin birbirine paralel olarak dizilmesiyle selüloz lifleri oluşur. Liflerin yaptığı zincir içi ve zincirler arası hidrojen bağlarıyla fibriler bir yapı kazanır ve dayanıklı hale gelir.


- Selüloz, suda çözünmez. Asitlerle kısmi hidrolizi sellobiozu, tam hidrolizi β -glikozları verir.
- İnsanlarda $\beta(1\rightarrow4)$ glikozid bağınyı yıkan bir enzim olmadığından, besinlerle alınan selüloz sindirilemez. Kapladığı hacmin fazla olmasından dolayı, bağırsak hareketlerinin uyarılmasını sağlar, feçes oluşumunu ve atılımını kolaylaştırır.
- Selüloz *selülaz* enzimi tarafından hidrolize edilir (beyaz karınca, tahta kurusu vb.). Ayrıca geviş getiren hayvanlardaki bakteriler selülaz salgıladıklarından, bu hayvanlar otları sindirebilirler.



	Cellulose	Starch		Glycogen
		Amylose	Amylopectin	
Source	Plant	Plant	Plant	Animal
Subunit	β -glucose	α -glucose	α -glucose	α -glucose
Bonds	1-4	1-4	1-4 and 1-6	1-4 and 1-6
Branches	No	No	Yes (~per 20 subunits)	Yes (~per 10 subunits)
Diagram				
Shape				

Dekstran


- Glikoz moleküllerinin birleşmesiyle oluşur.
- Bazı mikroorganizmaların sakkarozlu ortamda üremeleri sırasında meydana gelirler. Maya ve bakterilerin depo/yedek polisakkarididir.
- α -(1→6), α -(1→4), α -(1→3) ve α -(1→2) bağlarını içerir.
- Dekstranların kısmi hidrolizi ile oluşan çözeltileri viskoz olduğu için, kanamalarda, hastalara plazma yerine damar boşluğunu doldurmak amacıyla injekte edilir. Dekstran yapay gözyaşı ve oftalmolojik preparatların da bileşimine girer.



İnülin




- D-Früktoz birimlerinin β -(1 $\rightarrow$ 2) glikozid bağıyla bağlanmasından oluşan depo/yedek polisakkarididir.
- Yer elması, soğan, sarımsak ve enginar gibi bitkilerde bulunur.
- Suda çözünüp ancak böbrek tubuluslarından geri emilmediği için, glomerüler filtrasyon hızının ölçülmesinde kullanılır (inülin klirens testi)



Kitin

- Böcekler ve bazı kabuklu canlıların dış yüzeyindeki kabukları oluşturan bir yapı polisakkarididir.
- N-Asetil-D-glikozamin birimlerinin $\beta(1 \rightarrow 4)$ glikozid bağı ile bağlanmasından oluşur.



2) HETEROPOLİSAKKARİDLER

(Glikozaminoglikanlar, Mukopolisakkaridler)


- Monosakkarid ve türevlerinin yanında sülfat, fosfat gibi ek gruplar içeren, yüksek molekül ağırlıklı polimerlerdir.

Başlıca heteropolisakkaridler:

- Hiyaluronik asid
- Heparin
- Kondroitin sülfatlar
- Keratan sülfat
- Mukoitin sülfat
- Kan grubu maddeleri

Hiyalüronik asit


- [D-Glikuronik asit + N-asetilglukozamin]_n
- Sülfat içermez.
- Bulunduğu dokuyu mekanik travmaya karşı korur, viskoziteyi sağlar.
- Bağ dokusu, sinovyal sıvı, gözün vitröz sıvısı ve göbek kordonunda bulunur.
- Hiyaluronidaz enzimi ile yıkılır (spermada bulunur).



Hiyaluronik asit

Heparin


- $\left[\begin{array}{ll} \text{D-glikozamin} & + \text{L-idüronik asidin } \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ esteri} \\ (-\text{NH}_2 \text{ gruplarından biri} & \text{veya D-Glikuronik asid (seyrek)} \\ \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ ile esterleşmiş)} & \end{array} \right]_n$
- Organizmada yapısal görevi yok.
- Akciğer, karaciğer, deri ve bağırsak mukozasında (mast hücreleri) bol bulunur.
- Antikoagülan (Hastalık tedavisinde)
- Heparinaz adı verilen karaciğer ve böbreklerde bulunan bir enzim ile hidroliz olur.



D-Glucuronate-2-sulfate

N-Sulfoglucosamine
6-sulfate


Heparin



Heparin

Kondroitin sülfat A ve C


- [D-Glikuronik asit + N-Asetil-Galaktozamin sülfat]_n
- Kondroitin sülfat A'da galaktozamin 4. C'da, Kondroitin sülfat C'de 6. C'da O-sülfat içerir.
- Bağ dokusu, kemik ve kıkırdakta bulunur.
- Kondroitin sülfat B (Dermatan sülfat): [N-asetilgalaktozamin + L-idüronik asit]_n



Kondroitin sülfat A

Keratan sülfat

- [N-asetilglikozamin + D-galaktoz]_n
- Üronik asit içermez.
- Kondroitin sülfat ile birlikte kemik, kıkırdak, kornea ve intervertebral disklerde bulunur.



Keratan sülfat


Mukoitin sülfat

- [N-asetilglikozamin sülfat + D-Glikuronik asit]_n
- Mukoza salgılarında (tükürük, mide özsuyu vb.) proteinlerle birleşmiş olarak bulunur.

Kan grubu maddeleri

- [D-glikozamin ve/veya D-Galaktozamin + D-Galaktoz, L-Fukoz, Sialik asid]_n
- Eritrositlerin duvarlarında bulunurlar.

- ABO kan grubu maddelerinde glikoz, galaktoz, L-fukoz, N-asetil glikozamin ve N-asetil galaktozamin yer alır. Bu monosakkaridlerin diziliş sırası, ABO sistemine göre kan grubunu belirler.



Heteropolisakkarid + Protein= **MUKOPROTEİN (MUKOİD)**
(Mukopolisakkarid) (% 25'i protein, % 75'i karbohidrat)

Mukozalardan salgılanan, mukopolisakkarid ve mukoprotein karışımı olan maddelere **musin** adı verilir.





Teşekkürler...